

Vernetzte Arzneimitteltherapiesicherheit mit dem elektronischen Medikationsplan in Rheinland-Pfalz



UNIVERSITÄTS**medizin.**
MAINZ

Dr. Claudia Mildner, Inga Ulmer, Prof. Irene Krämer

APS Jahrestagung Berlin, 15. April 2016

Design des Modellprojektes eMediplan RLP

- Multizentrisch
- Intersektoral
- Interdisziplinär

- Patientenzahl: 600
 - Einschlusskriterien: mind. drei Dauer-Arzneimittel, Hausarzt und/oder Stammapothekeanbindung
- Beobachtungsdauer: mindestens 6 Monate


Studienziele Medikationsplan RLP

Umsetzungsmöglichkeit des **bundeseinheitlichen Medikationsplans** in elektronischer Form:

- Ermittlung der Praxistauglichkeit, Lesbarkeit, Nutzbarkeit, Nutzungsgrad
- Akzeptanz und Zufriedenheit bei Patienten, Ärzten, Apothekern
- Beitrag zur Arzneimitteltherapiesicherheit

Zwischenauswertung Januar 2016

- Patienten entlassen mit Medikationsplan: 386
- Aktualisiert im ambulanten Bereich: 151 Pat.
- 259 teilnehmende Stammapotheken und 186 Hausärzte
- Medikationspläne gesamt: 1260; 12660 Arzneimittel

Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Form	mor- gens	mi- tags	abends	zur Nacht	Einheit	Hinweise	Grund
Medikationsplan für: Anna Testmaus_1 geb. am: 01.01.1932										
Seite 1 von 1 ausgedruckt von: null Tel: E-Mail: ausgedruckt am: 25.06.2015										
										
Verordnete Medikation										
Ramipril	-	5 mg	Tabl	1	0	0	-		unabhängig von den Mahlzeiten	Bluthochdruck
3x pro Tag Blutdruck messen										
Harnstoff 10% in Basiscreme 100 g				1	0	1	-		abends und morgens auf die betroffenen Stellen auftragen	trockene Haut
Metoprolol	Boloc-Zahl® 95 mg, 30 Retardtabletten N1	95mg	RetTabl	1	0	1	-	Stck	zu oder nach den Mahlzeiten	Bluthochdruck
Amlodipin	-	5mg	Tabl	1	0	1	-	Stck	unabhängig von den Mahlzeiten, kein Grapefruitsaft	Bluthochdruck
Selbstmedikation										
Calcium Carbonat + Colecalciferol	Calcvit D® 600mg/400 I.E.	1500mg, 10µg	BrTabl	0	0	1	1	Stck	unabhängig von den Mahlzeiten, mind. 2 Stunden Abtand zu Ciprofloxacin	Osteoporose
zeitlich befristete Medikation										
Ciprofloxacin	-	500 mg	Tabl	1	0	0	-	Stck	unabhängig von den Mahlzeiten, nicht zusammen mit Milchprodukten einnehmen	Spondylodiscitis

Wichtige Hinweise
Ciprofloxacin Einnahme bis 30.06.15

Zwischenauswertung Januar 2016

Auswertung der Patientenzufriedenheit (Rücklaufquote 71%)

- Erster Medikationsplan: 71%
- Gute Lesbarkeit ,Übersichtlichkeit, verständlicher Inhalt des Medikationsplans: $\geq 95\%$
- Möglichkeit der Aktualisierung durch Hausarzt und Stammapothecker: 93%
- Mitnahme des Medikationsplans: 62%

Zwischenauswertung Januar 2016

Auswertung der Patientenzufriedenheit

- Angabe von Einnahmegründen und –hinweisen: 90% bzw. 95%
- Neue Informationen zu Einnahmegründen und –hinweisen: 65% bzw. 74%
- Unterstützende Arzneimittelberatung: 82%

Fazit

- Bundeseinheitlicher Medikationsplan in elektronischer Form ist praxistauglich – Aktualisierung durch beteiligte Leistungserbringer
- Akzeptanz und Zufriedenheit bei Patienten